

治療計画書

療法名

カルボプラチン

(ID 0) ☆7

療法 1サイクル 4 週

疾患名 耳下腺がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん

| 注射 内服 放射線 | Rp | 商品名 照射部位 | 用量(/回) | 投与ルート | 投与時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------------|---------------------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | | | 用量(/日) | 用法 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| 注射 | | グラニセトロン | 3 mg | 点滴 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | デキサート | 9.9 mg | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | カルボプラチン | 300-400 mg/m ² | 点滴 | 1時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | 生理食塩液 | 250 ml | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線 | | | Gy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特記事項

制吐剤は適宜使用する

カルボプラチンの血小板減少はAUCと関連するため、腎機能に注意し、AUC換算で6の値を超える場合は特に副作用の発現に注意する。

減量規定

| 薬品名 | 標準投与量 | 1段階減量 | 2段階減量 | 3段階減量 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |