療法 1サイクル 3~4 週

疾患名 小細胞肺がん(4サイクル)

治療計画書

- 天元			7 1 7 10 /																									—
注射		45	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1						2						3				T	4					П
内服	Rp	商品名	用量(/日)	用法	<u> </u>	1	2	3 4	1 5	6			9 1	0 11	12	13			16 1	7 18	19 2	20 2		23	24	25 2	6 2	28
放射線		照射部位	照射量																									П
		アロキシ	0.75 mg	点滴	30分																							П
注射	1	デキサート	6.6 mg																									
射	ļ '	生理食塩液	100 ml																									
																									Ш			
		デキサート	6.6 mg	点滴	30分																							
注射	2	生理食塩液	100 ml			1	•																					
射	_																											
																						\bot		Ш	\Box			
		生理食塩液	50 ml	点滴	15分																							
注射	3					•	•																					
射																												
	Н	===	100 /2	F > +	0.0+88		\dashv								-			_	_	-		+		Ш	\vdash	4	+	4
注射		ラステット	100 mg/m²	点滴	2時間	•																						
	4	5%糖液	500 ml				•																					
注射		生理食塩液	50 ml	点滴	15分		-			H		+						+				+		H	\vdash	+	+	H
		工生及塩/収	30 1111	ボル	1371	-																						
	5					•	•																					
注射		カルボプラチン	XAUC5	点滴	1時間30分		_					+	+		+	H		+	+	+	H	\pm		H	\forall	+	+	+
		生理食塩液	250 ml	WAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																							
	6		※最大800mg																									
			71(42) (000)			1																						
注射		生理食塩液	50 ml	点滴	15分													T				\top		Ħ	\Box			Ħ
	7					•																						
																						Т			П			
注射	8																											
																					Ш	_			Ш	4		
注射	9																											
													_					4				4		Ш	\vdash	4	_	4
注射																												
	10					-																						
内服	_														+			+	+	+	H	+		H	\vdash	+	+	\vdash
内服	1						\dashv			H	H	+	+		H		+	+	+	+	H	+	-	H	\vdash	+	+	H
内服	3						\dashv		+	H		+	+		H		+	+	+	+	\forall	+		H	\vdash	+	+	H
内服	4						\dashv		+	H	H	+	+	+	┢			+	+	H	\forall	+	+	H	\dashv	+	+	H
内服	5						\dashv		+	H		+	H	+	H			+	+	H	\forall	+	+	\forall	\dashv	+	+	H
内服	6						\dashv		+	Н	H	+	٠	+	H		+	t	+	+		+		Ħ	\vdash	+	+	H
内服	7						\dashv			H		+			H		+	\dagger	+		Ħ	+		H	\vdash	+	+	H
内服	8						\dashv			H		+			H		+	\dagger	+		Ħ	+		H	\vdash	+	+	H
内服	9						7			Н		\dagger	t		t		t	1	+	t	Ħ	+		Ħ	\sqcap	+	+	Ħ
内服	_						7			Н		\dagger	t		t		t	1	+	t	Ħ	+		Ħ	\sqcap	+	+	Ħ
放射線			Gy							Н											\Box	\dagger		Ħ	\sqcap	+	+	П
		1			特記事項																	_		ш				\dashv
シス	_ರ ೆ:	ラチンに対してカルボプラチンは	血液毒性が強く・	木肉はの注音	占什白血	步浦	://>	吐る	う同	沈沈	ᅐᆙ	Ł																

シスプラチンに対してカルボプラチンは血液毒性が強く、本療法の注意点は白血球減少時の感染予防

 薬品名
 ラステット

 標準投与量
 100 mg/m²

 1段階減量
 G-CSFを使用後白血球減

 2段階減量
 少、好中球減少がG4、もしく 3段階減量

 3段階減量
 は血小板減少がG4の場合