(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　シスプラチン+エトポシド+イミフィンジ　療法　1サイクル 3 週

疾患名　進展型小細胞肺癌(4サイクル)

注射/内服/放射線	Rp	商品名	用量(/回) / 用量(/日) / 照射部位	照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	50 ml		点滴	15分	●																											
注射	2	イミフィンジ	※1500 mg/body		点滴	60分	●																											
		生理食塩液	100 ml																															
注射	3	生理食塩液	50 ml		点滴	15分	●																											
注射	4	アロキシ	0.75 mg		点滴	30分	●																											
		デキサート	9.9 mg																															
		生理食塩液	100 ml																															
注射	5	デキサート	6.6 mg		点滴	30分		●	●																									
		生理食塩液	100 ml																															
注射	6	生理食塩液	500 ml		点滴	2時間	●																											
		硫酸Mg補正液	8 mEq																															
注射	7	生理食塩液	50 ml		点滴	15分		●	●																									
注射	8	ラステット	80-100 mg/㎡		点滴	2時間	●	●	●																									
		5%糖液	500 ml																															
注射	9	生理食塩液	50 ml		点滴	15分	●																											
注射	10	シスプラチン	75-80 mg/㎡		点滴	2時間	●																											
		生理食塩液	500 ml		全量500mlに調製																													
注射	11	YDソリタ-T3	500 ml		点滴	2時間	●																											
		フロセミド	20 mg																															
注射	12	YDソリタ-T3	500 ml		点滴	2時間		●	●																									
注射	13	ソリューゲンF	500 ml		点滴	2時間	●	●	●																									
内服	1	アプレピタント	125 mg		抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	2	アプレピタント	80 mg		1日1回朝食後			●	●																									
内服	3	デカドロン	8 mg		1日1(-2)回朝(昼)食後					●	(●)																							
内服	4																																	
内服	5																																	
内服	6																																	
放射線																																		

特記事項

イミフィンジ：インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。
※体重30kg以下の場合は20mg/kgで投与。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					