(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ビノレルビン　　療法　1サイクル 4 週

疾患名　非小細胞肺がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	30分	●							●							●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●							●													
注射	3	ナベルビン	25 mg/㎡	点滴	5分	●							●							●													
		生理食塩液	50 ml		(全開)																												
注射	4	生理食塩液	200 ml	点滴	1時間	●							●							●													
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

・血液毒性が強く、白血球減少、好中球減少の発現率は用量依存的に上昇する　・起壊死性薬剤であるため、血管外漏出がないことを十分に確認する

・投与日の白血球数＜2000では投与を延期する

減量規定

薬品名	ナベルビン				
標準投与量		25 mg/㎡			
1段階減量	2.0＜T-Bil≦3.0	50 %			
2段階減量	3.0＜T-Bil	25 %			
3段階減量					