

治療計画書

療法名

ペムトレキセド

療法

1サイクル 3 週

疾患名 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

| 注射 内服 放射線 | Rp | 商品名 | 用量(/回) | 投与ルート | 投与時間 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|------------------|-----------------------|----------------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 用量(/日) | 用法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 照射部位 | 照射量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 1 | デキササート | 6.6 mg | 点滴 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100 ml | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 2 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 3 | アリムタ | 500 mg/m ² | 点滴 | 10分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100 ml | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 4 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 5 | メチコパール | 1 mg | 筋注 | | アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 1 | デカドロン | 8 mg | 1日1(-2)回朝(昼)食後 | | ●● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 2 | バンピタン(葉酸0.5mg/g) | 1 g | 1日1回 | | アリムタ初回投与の7日以上前から1日1回連日経口投与し、最終投与日から22日目まで継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特記事項

アリムタによる重篤な副作用軽減のため葉酸及びビタミンB₁₂を投与する。

※詳細は適正使用ガイド参照

| | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|--|
| 薬品名 | アリムタ※ | | | |
| 標準投与量 | 500 mg/m ² | | | |
| 1段階減量 | 400 mg/m ² | | | |
| 2段階減量 | 中止 | | | |
| 3段階減量 | | | | |