

治療計画書

療法名

カルボプラチン+アブラキサン

(ID 0) ☆7

療法

1サイクル 3 週

疾患名 非小細胞肺癌(6サイクル)

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																													
			用量(/日)	用法																															
		照射部位	照射量																																
注射	1	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分																														
		デキサート	9.9 mg			●																													
		生理食塩液	100 ml																																
注射	2	デキサート	6.6 mg	点滴	30分																														
		生理食塩液	100 ml																																
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																													
注射	4	アブラキサン	100 mg/m ²	点滴	30分																														
		生理食塩液	50 ml			●																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																													
注射	6	カルボプラチン	※AUC6	点滴	1時間30分																														
		生理食塩液	250 ml			●																													
			※最大800mg																																
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																													
注射	8																																		
注射	9																																		
注射	10																																		
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●																												
内服	2																																		
内服	3																																		
内服	4																																		
内服	5																																		
内服	6																																		
内服	7																																		
内服	8																																		
内服	9																																		
内服	10																																		
放射線			Gy																																

特記事項

アブラキサンでは過敏症予防のための前投薬は必須ではないが、必要に応じステロイド剤や抗ヒスタミン剤の前投薬を検討する。
溶解後の懸濁液は生理食塩液等で希釈しないこと。
血漿分画製剤にかかわる同意書の取得が必要。

減量規定

薬品名	カルボプラチン	アブラキサン		
標準投与量	AUC6	100 mg/m ²		
1段階減量	AUC4.5	75 mg/m ²		
2段階減量	AUC3	50 mg/m ²		
3段階減量				