

治療計画書

療法名

カルボプラチン+ゲムシタビン

療法

1サイクル 3~4 週

疾患名 非小細胞肺がん(4サイクル)

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																																	
		照射部位	用量(/日)	用法																																		
注射	1	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分																																	
		デキサート	6.6 mg				●																															
		生理食塩液	100 ml																																			
注射	2	デキサート	6.6 mg	点滴	30分																																	
		生理食塩液	100 ml																																			
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																																	
						●																																
注射	4	カルボプラチン	※AUC5	点滴	1時間30分																																	
		生理食塩液	250 ml				●																															
			※最大800mg																																			
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																																	
						●																																
注射	6	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴	30分																																	
		生理食塩液	100 ml				●																															
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																																	
						●																																
注射	8																																					
注射	9																																					
注射	10																																					
内服	1																																					
内服	2																																					
内服	3																																					
内服	4																																					
内服	5																																					
内服	6																																					
内服	7																																					
内服	8																																					
内服	9																																					
内服	10																																					
放射線			Gy																																			

特記事項

- ・腎毒性、消化器毒性は少ないものの血液毒性は強い
- ・day8で白血球数<3000、好中球数<1500又は血小板数<10万の場合は投与をskipする

減量規定

薬品名 標準投与量		カルボプラチン AUC5	ゲムシタビン 1000 mg/m ²
減量	WBC<1000、PLT<25000、 38℃以上の発熱+G3 (<1000)以上の好中球減少、 G3以上の非血液毒性、day8をskipした場合	AUCを1下げる	200mg/m ² ずつ減量