

治療計画書

療法名

カルボプラチン+ペムトレキセド

療法

1サイクル 3 週

疾患名 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(6サイクル)

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																																
			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		照射部位	照射量																																		
注射	1	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分																																
		デキサート	6.6 mg			●																															
		生理食塩液	100 ml																																		
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																																
						●																															
注射	3	アリムタ	500 mg/m ²	点滴	10分																																
		生理食塩液	100 ml			●																															
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																																
						●																															
注射	5	カルボプラチン	※AUC6	点滴	1時間30分																																
		生理食塩液	250 ml ※最大800mg			●																															
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																																
						●																															
注射	7	メチコパール	1 mg	筋注		アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。																															
注射	8																																				
注射	9																																				
注射	10																																				
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●																													
内服	2	バンピタン(葉酸0.5mg/g)	1 g	1日1回		アリムタ初回投与の7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与し、最終投与日から22日目まで継続																															
内服	3																																				
内服	4																																				
内服	5																																				
内服	6																																				
内服	7																																				
内服	8																																				
内服	9																																				
内服	10																																				

特記事項

アリムタによる重篤な副作用軽減のため葉酸及びビタミンB₁₂を投与する。
※症状により2段階減量となることあり。詳細は添付文書参照。

減量規定

薬品名	カルボプラチン	アリムタ※		
標準投与量	AUC6	500 mg/m ²		
1段階減量	AUC5	前回の用量の75%		
2段階減量	AUC4	前回の用量の50%		
3段階減量	中止	中止		