療法

1サイクル 4 週

## 切除不能Ⅲ期非小細胞肺がん(2サイクル) 疾患名

注射		<b></b>	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1						2						3						4					
内服	Rp	商品名	用量(/日)	用法		1	2	3	4 5	5 6	7	8	9	10 1	1 1:	2 13	14	15	16 1	17 1	8 1	9 20	21	22	23	24	25 2	6 2	7 28
放射線		照射部位	照射量																										
		アロキシ	0.75 mg	点滴	30分												П							T					
注		デキサート	6.6 mg	VIII. 2		1_																							
注射	1	生理食塩液	100 ml			•																							
N)		工程及温水	100 1111			-																							
		生理食塩液	100 ml	点滴	30分				-	-	+	$\dashv$	-	_	+		Н		_	-	+		+	-	H	-		+	
24		工埕及塩水	100 1111	<b>从</b> 间	307]	-																							
注射	2																												
别						4																							
					-1												Ш												
		ドセタキセル 生理食塩液	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	1																							
注射	3	生理食塩液	250 ml			•						•																	
射	١																												
		生理食塩液	500 ml	点滴	2時間												П									T	T		
注						ے																							
注射	4					•																							
-53																													
		シスプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間		H			+		$\dashv$		$\dashv$	H		H		$\dashv$		+			H		$\dashv$	+	t	
注		生理食塩液	250 ml	全量250mlに調製	1 4/1 [41]																								
注射	5	工程及温水	230 1111	王里230IIIIC嗣表		•																							
ויל						-																							
		VD: 41.5 TO	500 ml	F >±	0.0± 88							$\perp$	_				Н							-		_			
		YDソリターT3		点滴	2時間	4																							
注射	6	フロセミド	20 mg			•																							
射						1																							
		ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間																								
注射	7					•						•																	
射	ĺ																												
						1																							
注射	_					1																							
射	8					1																							
-3.3																													
																	Н											T	
注						1																							
注射	9					1																							
ניג						-																							
													_				Н				-					_		+	
24						1																							
注射	10					4																							
别						4																							
					/E\ A #		Ц					Щ			_		Ш				-			_					
内服		デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝	(昼)食後		•					Щ	•				Ш		4							_			
内服	_						Ц					Щ					Ш		4							_		1	
内服	3						Ц					Щ					Ш		4							_			
内服							Ш					Ш					Ш												
内服																	Ш												
内服																┙						L		Ĺ		$\prod$		╝	
内服	7																												
内服	8														T		П									$\neg$	Т		
内服	9																												
内服							П					П					П											T	
放射線		胸部(6~8週間)	60 Gy	2Gy × 30	00	•	•	•				•	•	•			П	•	•	9 (				•	•	•	•		
	_	pro			特記事項	<u> </u>			- 1 -			-1	-1	- 12				_	- 1							-/		_	
生II n上	æ	注り て適宜イナバカプセルた母	L																										

制吐療法として適宜イメンドカプセルを併用のこと。 放射線治療は原則月~金曜日施行

減量規定												
薬品名	シスプラチン	ドセタキセル										
標準投与量	40 mg∕ <b>m</b> <sup>2</sup>	40 mg∕ <b>m</b> ²										
1段階減量	30 mg∕ <b>m</b> <sup>2</sup>	30 mg∕ <b>m</b> ²										
2段階減量	20 mg∕ <b>m</b> ²	20 mg∕ <b>m</b> ²										
3段階減量	中止	中止										