

治療計画書

療法名

シスプラチン+ペメトレキセド

療法

1サイクル 3 週

疾患名 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																												
						用量(/日)	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		照射部位	照射量																														
注射	1	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分																												
		デキサート	9.9 mg			●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	生理食塩液	500 ml	点滴	2時間																												
		硫酸Mg補正液	8 mEq			●																											
注射	3	YDソリターT3	500 ml	点滴	2時間																												
						●●●																											
注射	4	アリムタ	500 mg/m ²	点滴	10分																												
		生理食塩液	100 ml			●																											
注射	5	生理食塩液	100 ml	点滴	30分																												
						●																											
注射	6	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴	2時間																												
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製		●																											
注射	7	YDソリターT3	500 ml	点滴	2時間																												
		フロセミド	20 mg			●																											
注射	8	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間																												
						●●●																											
注射	9	メチコバル	1 mg	筋注		アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。																											
注射	10																																
内服	1	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	2	イメンド	80 mg	1日1回朝食後		●●																											
内服	3	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		●●●●																											
内服	4	パンビタン(葉酸0.5mg/g)	1 g	1日1回		アリムタ初回投与の7日以上前から1日1回連日経口投与し、最終投与日から22日目まで継続																											
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アリムタによる重篤な副作用軽減のため葉酸及びビタミンB12を投与する。
※症状により2段階減量となることあり。詳細は添付文書参照。

薬品名	シスプラチン	アリムタ※		
標準投与量	75 mg/m ²	500 mg/m ²		
1段階減量	前回の用量の75%	前回の用量の75%		
2段階減量	前回の用量の50%	前回の用量の50%		
3段階減量	中止	中止		