(ID　0　) ☆7

# 治療計画書

療法名 カルボプラチン+ペメトレキセド+キイトルーダ　療法　1サイクル 3 週

疾患名　切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺がん(4サイクル)

| 注射/内服/放射線 | Rp | 商品名 / 照射部位 | 用量(/回) / 用量(/日) / 照射量 | 投与ルート / 用法 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射 | 1 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 2 | キイトルーダ | 200 mg/body | 点滴 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 3 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 4 | アロキシ | 0.75 mg | 点滴 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート | 6.6 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 5 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 6 | アリムタ | 500 mg/㎡ | 点滴 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 100 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 7 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 8 | カルボプラチン | ※AUC5 | 点滴 | 1時間30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 250 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ※最大750mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 9 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 15分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 10 | メチコバール | 1 mg | 筋注 | | アリムタ初回投与の少なくとも7日前に，ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。その後，アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 1 | デカドロン | 8 mg | 1日1(～2)回朝(昼)食後 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 2 | パンビタン(葉酸0.5mg/g) | 1 g | 1日1回連日投与 | | アリムタ初回投与の7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与し、最終投与日から22日目まで継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線 | | | Gy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特記事項

アリムタによる重篤な副作用軽減のため葉酸およびビタミンB12を投与する(添付文書参照)。
キイトルーダ：インラインフィルター(0.2～5μ m)を使用すること。

減量規定

| 薬品名 | カルボプラチン | アリムタ | キイトルーダ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準投与量 | AUC5 | 500 mg/㎡ | 200 mg | | |
| 1段階減量 | AUC3.75 | 375 mg/㎡ | 減量不可 | | |
| 2段階減量 | AUC2.5 | 250 mg/㎡ | | | |
| 3段階減量 | 中止 | 中止 | | | |