

治療計画書

療法名

ペムトレキセド+キイトルーダ療法

療法

1サイクル 3 週

疾患名 切除不能な進行・再発の非扁平上皮非小細胞肺がん(キイトルーダ:最大35サイクル)

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																																
			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		照射部位	照射量																																		
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																															
		キイトルーダ	200 mg/body	点滴	30分	●																															
注射	2	生理食塩液	100 ml																																		
		生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																															
注射	3	デキサート	6.6 mg	点滴	30分	●																															
		生理食塩液	100 ml																																		
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																															
		アリムタ	500 mg/m ²	点滴	10分	●																															
注射	5	生理食塩液	100 ml																																		
		生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																															
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																															
		メチコパール	1 mg	筋注																																	
注射	7					アリムタ初回投与の少なくとも7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。																															
		注射	9																																		
注射	10																																				
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(～2)回朝(昼)食後		●●																															
内服	2	バンピタン(葉酸0.5mg/g)	1 g	1日1回連日投与		アリムタ初回投与の7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与し、最終投与日から22日目まで継続																															
内服	3																																				
内服	4																																				
内服	5																																				
内服	6																																				
内服	7																																				
内服	8																																				
内服	9																																				
内服	10																																				
放射線				Gy																																	

特記事項

アリムタによる重篤な副作用軽減のため葉酸およびビタミンB12を投与する(添付文書参照)。
キイトルーダ: インラインフィルター(0.2～5μ m)を使用すること。

減量規定

薬品名	アリムタ	キイトルーダ		
標準投与量	500 mg/m ²	200 mg		
1段階減量	375 mg/m ²	減量不可		
2段階減量	250 mg/m ²			
3段階減量	中止			