(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　シスプラチン+ペメトレキセド　療法　1サイクル 3 週

疾患名　悪性胸膜中皮腫

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	アロキシ	0.75 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	9.9 mg																														
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	生理食塩液	500 ml	点滴	2時間	●																											
		硫酸Mg補正液	8 mEq																														
注射	3	YDソリターT3	500 ml	点滴	2時間	●	●●	●●																									
注射	4	アリムタ	500 mg/㎡	点滴	10分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	5	生理食塩液	100 ml	点滴	30分	●																											
注射	6	シスプラチン	75 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																													
注射	7	YDソリターT3	500 ml	点滴	2時間	●																											
		フロセミド	20 mg																														
注射	8	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●●	●																										
注射	9	メチコバール	1 mg	筋注		アリムタ初回投与の少なくとも7日前に，ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。その後，アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと（3コースごと）に1回投与する。																									
注射	10																																
内服	1	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	2	イメンド	80 mg	1日1回朝食後			●●																										
内服	3	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●●	●	(●)																								
内服	4	パンビタン（葉酸0.5mg/g）	1 g	1日1回		アリムタ初回投与の7日以上前から1日1回連日経口投与し、最終投与日から22日目まで継続																											
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アムリタによる重篤な副作用軽減のため葉酸及びビタミンB_{12}を投与する。
※症状により2段階減量となることあり。詳細は添付文書参照。

減量規定

薬品名	アリムタ※	シスプラチン			
標準投与量	500 mg/㎡	75 mg/㎡			
1段階減量	前回の用量の75%	前回の用量の75%			
2段階減量	前回の用量の50%	前回の用量の50%			
3段階減量	中止	中止			