(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　XP　　療法　1サイクル 3 週

疾患名　治癒切除不能な進行・再発の胃がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	2	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	3	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	9.9 mg																														
注射	4	シスプラチン	80 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調整																													
注射	5	フロセミド	10 mg	静注(側管)		●																											
注射	6	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	7	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	8																																
注射	9																																
内服	1	ゼローダ	2000 mg/㎡	1日2回朝夕食後※		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	3	イメンド	80 mg	1日1回朝食後			●	●																									
内服	4	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	●																								
内服	5																																

特記事項

一旦減量した後はカペシタビン、シスプラチンともに増量しないこと。
※day1夕食後からday15朝食後に服用

ゼローダ減量基準	1日投与量		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36㎡未満	2400mg/日	1800mg/日	1200mg/日
1.36㎡以上1.41㎡未満	3000mg/日		
1.41㎡以上1.51㎡未満		2400mg/日	
1.51㎡以上1.66㎡未満			1800mg/日
1.66㎡以上1.81㎡未満	3600mg/日		
1.81㎡以上1.96㎡未満		3000mg/日	
1.96㎡以上2.11㎡未満	4200mg/日		
2.11㎡以上			2400mg/日

減量規定

薬品名	ゼローダ	シスプラチン			
標準投与量	上記参照	60≦CCr	80 mg/㎡		
1段階減量		51≦CCr≦59	60 mg/㎡		
2段階減量		41≦CCr≦50	40 mg/㎡		
3段階減量	中止(CCr≦30)	CCr≦40	中止		