(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　（少量）イリノテカン＋マイトマイシンC　療法　1サイクル 4～5 週

疾患名　進行再発胃がん

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	マイトマイシン	4 mg/㎡	点滴	全開	●														●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	4	トポテシン	70-80 mg/㎡	点滴	2時間	●														●													
		生理食塩液	500 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	半夏瀉心湯	7.5 g	1日3回食間/食前		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2	ウルソ	300 mg	1日3回食後		●	●	●												●	●	●											
内服	3	プリンペラン	15 mg	1日3回食前		●	●	●												●	●	●											
内服	4	重曹	3 g	1日3回食間		●	●	●												●	●	●											
内服	5	酸化マグネシウム/マグラックス	1.2-1.8 g	1日3回食後		●	●	●												●	●	●											
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

day15のトポテシン、マイトマイシン投与後の休薬期間は、2または3週間とする。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					