(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　mFOLFOX6　療法　1サイクル 2 週

疾患名　胃癌

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	20 ml	CVCポート	ルートフラッシュ	●														●													
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●														●													
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	エルプラット	85 mg/㎡	点滴	2時間	●														●													
		5%糖液	250 ml																														
注射	4	レボホリナート	200 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●														●													
		生理食塩液	200 ml																														
注射	5	5-FU	400 mg/㎡	点滴	全開	●														●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●														●													
注射	7	5-FU	2400 mg/㎡	持続注入用ポンプ	46時間	●	●	●												●	●	●											
		生理食塩液	100 ml	全量100mlに調製																													
注射	8	ヘパリンNaロックシリンジ	100 IU	CVCポート				●														●											
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●													●	●											
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

エルプラット総投与量が600mg/㎡を超えた場合、エルプラットは担当医の判断で適宜休止して次のサイクルを開始することができる。

減量規定

薬品名	エルプラット	レボホリナート	5-FU(急速)	5-FU(持続)	
標準投与量	85 mg/㎡	200 mg/㎡	400 mg/㎡	2400 mg/㎡	
1段階減量	65 mg/㎡	減量なし	300 mg/㎡	2000 mg/㎡	
2段階減量	50 mg/㎡		200 mg/㎡	1600 mg/㎡	
3段階減量					