

疾患名 治療切除不能な進行・再発の胃癌

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																												
			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		照射部位	照射量																														
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	30分																												
		生理食塩液	100 ml			●																											
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
						●																											
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	15分																												
						●																											
注射	4	サイラムザ	8 mg/kg	点滴(側管)	※1時間																												
		生理食塩液	250 ml	インラインフィルター使用		●																											
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	15分																												
						●																											
注射	6	アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分																												
		生理食塩液	100 ml	【使用禁】		●																											
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴	15分																												
						●																											
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	抗癌剤投与30分前		●																											
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																

特記事項

※G1または2のinfusion reactionが発現した場合は2時間になるよう減速し、その後の投与においても減速した速度で投与する。  
 (infusion reactionが発現した場合の対応については添付文書参照)  
 特定生物由来製品のため同意書の取得が必要。  
 サイラムザはインラインフィルターを使用して投与。アブラキサンはインラインフィルター使用不可。  
 上記Rp 3-5については、インラインフィルターを使用し、側管より点滴静注。

減量規定

薬品名	アブラキサン	サイラムザ		
標準投与量	100 mg/m <sup>2</sup>	8 mg/kg		
1段階減量	80 mg/m <sup>2</sup>	6 mg/kg		
2段階減量	60 mg/m <sup>2</sup>	5 mg/kg		
3段階減量	中止	中止		