(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　XELOX+トラスツズマブ　　療法　1サイクル 3 週

疾患名　治癒切除不能な進行・再発の胃がん

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	2	トラスツズマブ≪初回≫	8 mg/kg	点滴	※1時間30分	●																											
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
		トラスツズマブ≪2回目以降≫	6 mg/kg	点滴	※30分																												
		生理食塩液	250 ml	注射用水で溶解																													
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
注射	5	エルプラット	130 mg/㎡	点滴	2時間	●																											
		5%糖液	250 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	7																																
注射	8																																
内服	1	ゼローダ	2000 mg/㎡	1日2回朝夕食後※※		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
内服	2	デカドロン	8 mg	1日(-2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																

特記事項

※トラスツズマブは初回90分以上かけて投与、忍容性が良好ならば2回目以降30分で投与可。※※day1夕食後からday15朝食後に服用
トラスツズマブを2週間休薬した場合、初回投与量の8mg/Kgを投与。

ゼローダ減量基準	1日投与量		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36㎡未満	2400mg/日	1800mg/日	1200mg/日
1.36㎡以上1.41㎡未満	3000mg/日		
1.41㎡以上1.51㎡未満		2400mg/日	
1.51㎡以上1.66㎡未満			1800mg/日
1.66㎡以上1.81㎡未満	3600mg/日		
1.81㎡以上1.96㎡未満		3000mg/日	
1.96㎡以上2.11㎡未満	4200mg/日		
2.11㎡以上			2400mg/日

減量規定

薬品名	エルプラット	ゼローダ※※	トラスツズマブ(2回目以降)		
標準投与量	130 mg/㎡	上記参照	6 mg/kg		
1段階減量	100 mg/㎡		減量なし		
2段階減量	85 mg/㎡				
3段階減量		中止 (CCr≦30)			