(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　エンハーツ　療法　1サイクル 3 週

疾患名　がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	6.6 mg																														
注射	2	5%糖液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	3	エンハーツ	6.4 mg/kg	点滴	初回90分	●																											
		5%糖液	100 ml	注射用水で溶解	2回目以降30分可																												
注射	4	5%糖液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	5																																
注射																																	
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(～2)回朝(昼)食後			●	●																									
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

エンハーツ：点滴バッグを遮光すること
インラインフィルター(0.2μm)を使用すること

減量規定

薬品名	エンハーツ				
標準投与量	6.4 mg/kg				
1段階減量	5.4 mg/kg				
2段階減量	4.4 mg/kg				
3段階減量	中止				