(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　ゲムシタビン+カルボプラチン　療法　1サイクル 3 週

疾患名　腎盂がん、尿管がん、膀胱がん、尿道がん（3サイクル）

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●							●																			
		デキサート	6.6 mg																													
注射	2	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴	30分	●							●																			
		生理食塩液	100 ml																													
注射	3	カルボプラチン	※AUC5	点滴	1時間	●																										
		生理食塩液	250 ml																													
			※最大800mg																													
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●							●																			
注射	5																															
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			(●)	(●)																								
内服	2																															
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

適応：PS0～1で主要臓器に大きな問題がないこと。慎重投与：PS2～3、80歳以上、肝機能障害、腎機能障害、糖尿病、血栓症
投与中止：PS4、重症感染症、重篤な不整脈、白血球3000/㎣以下、血小板8万/㎣以下、Hb8g/dl以下、
AST、ALT、ALP、T-Bil、Cr＞正常値上限×2.5

減量規定

薬品名	ゲムシタビン	カルボプラチン			
標準投与量	1000 mg/㎡	AUC5			
1段階減量	800 mg/㎡	AUC4			
2段階減量	600 mg/㎡	AUC3			
3段階減量					