

治療計画書

療法名

キイトルーダ(6週毎)

療法

1サイクル 6 週

疾患名 がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌(最長2年間)

注射 内服 放射線	Rp	商品名 照射部位	用量(/回)	投与ルート	投与時間																												
			用量(/日)	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	2	キイトルーダ 生理食塩液	400 mg/body 100 ml	点滴	30分	●																											
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														
						特記事項																											
						インラインフィルター(0.2~5μm)を使用すること。																											
						減量規定																											
薬品名																																	
標準投与量																																	
1段階減量																																	
2段階減量																																	
3段階減量																																	