(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　カバジタキセル＋プレドニゾロン　療法　1サイクル 3 週

疾患名　前立腺がん（※10サイクル）

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	ポララミン	5 mg	点滴	30分	●																											
		ファモチジン	20 mg																														
		デキサート	8.25 mg																														
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	30分	●																											
注射	3	ジェブタナ≪25mg未満≫	25 mg/㎡	点滴	1時間	●																											
		生理食塩液	※※100 ml																														
		ジェブタナ≪25mg以上65mg未満≫	25 mg/㎡	点滴	1時間																												
		生理食塩液	※※250 ml																														
		ジェブタナ≪65mg以上≫	25 mg/㎡	点滴	1時間																												
		生理食塩液	※※500 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	ルートフラッシュ	●																											
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	プレドニゾロン	10 mg	1日2回朝昼食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

※効果があれば10サイクル以上投与する場合あり。
※※0.10～0.26mg/mlに調製

減量規定

薬品名	ジェブタナ				
標準投与量	20 mg/㎡				
1段階減量	中止				
2段階減量					
3段階減量					