

治療計画書

療法名

キイトルーダ+インライタ

療法

1サイクル 3 週

疾患名 未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌(キイトルーダ:最大35サイクル)

注射 内服 放射線	Rp	商品名 照射部位	用量(回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
			用量(日)	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
		キイトルーダ 生理食塩液	200 mg/body 100 ml	点滴	30分	●																											
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	インライタ※	10 mg	1日2回	朝 夕	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
放射線			Gy																														

特記事項

キイトルーダ: インラインフィルター(0.2~5µm)を使用すること。
 インライタは適宜増減可(20mg/日まで)。
 ※インライタは1日目の夕より服用。

減量規定

薬品名	標準投与量	1段階増量	2段階減量	3段階減量