(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　キイトルーダ（6週毎）＋インライタ　療法　1サイクル 6 週

疾患名　未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌（キイトルーダ：最長2年間）

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
													2							3							4						
注射	1	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	2	キイトルーダ 生理食塩液	400 mg/body 100 ml	点滴	30分	●																											
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	15分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	インライタ※	10 mg	1日2回	朝		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					夕	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
放射線			Gy																														

特記事項

キイトルーダ：インラインフィルター（0.2～5μm）を使用すること。
インライタは適宜増減可（20mg/日まで）。
※インライタは1日目の夕より服用。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階増量					
2段階減量					
3段階減量					