(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　EpiC（エピルビシン+カルボプラチン）　療法　1サイクル 3 週

疾患名　卵巣がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	4.95 mg																														
注射	2	エピルビシン	40 mg/㎡	点滴	30分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	4	カルボプラチン	※AUC4-5	点滴	1時間以上	●																											
		生理食塩液	250 ml																														
			※最大800mg																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	2	イメンド	80 mg	1日1回朝食後			●	●																									
内服	3	デカドロン	4 mg	1日1回朝食後			(●)	(●)	(●)																								
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					