(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　GEM（ゲムシタビン）　療法　1サイクル 4 週

疾患名　がん化学療法後に増悪した卵巣がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
						1							2							3							4						
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	15分	●							●							●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	2	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴	30分	●							●							●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●							●							●													
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アレルギー予防のため適宜ファモチジンを追加する。
週2回以上、あるいは1回の点滴を60分以上かけて行うと副作用が増強することがあるためスケジュール通りに投与する。
胸部への放射線療法との同時併用は避けること。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					