(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　GemEpi（ゲムシタビン+エピルビシン）　療法　1サイクル　4　週

疾患名　卵巣がん

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	9.9 mg																														
注射	2	デキサート	6.6 mg	点滴	15分								●							●													
		生理食塩液	50 ml																														
注射	3	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴	30分	●							●							●													
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●							●							●													
注射	5	エピルビシン	40 mg/㎡	点滴	30分	●																											
		生理食塩液	100 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	(●)																								
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					