

治療計画書

療法名

CDDP(シスプラチン)

(ID 0) ☆7

療法 1サイクル 3 週

疾患名 進行・再発卵巣がん

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回) 用量(/日)	投与ルート 用法	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																											
		照射部位	照射量																														
注射	1	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	2	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	3	グラニセロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	9.9 mg																														
注射	4	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴	2時間以上	●																											
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																													
注射	5	ソリューゲンG	500 ml	点滴	2時間	●																											
		フロセミド	10 mg																														
注射	6	YDソリターT3	500 ml	点滴	2時間	●																											
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	2	イメンド	80 mg	1日1回朝食後		● ●																											
内服	3	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後		● ● ● ●																											
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名	シスプラチン			
標準投与量	70 mg/m ²			
1段階減量	55 mg/m ²			
2段階減量	40 mg/m ²			
3段階減量				