(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　lipoDXR(ドキシル)　療法　1サイクル 4 週

疾患名　がん化学療法後に増悪した卵巣がん

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	15分	●																											
		5%糖液	50 ml																														
注射	2	ドキシル≪90mg未満≫	50 mg/㎡	点滴	※90分可	●																											
		5%糖液	250 ml																														
		ドキシル≪90mg以上≫	50 mg/㎡	点滴	2時間																												
		5%糖液	500 ml																														
注射	3	5%糖液	50 ml	点滴	20分	●																											
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。　副作用により減量を行った場合、以降投与量を維持し増量しない。
手足症候群予防のため投与時に手首足首を冷却する。
※90mg未満の場合90分での投与が可能(1mg/分を超えないこと)。

減量規定

薬品名	ドキシル				
標準投与量	50 mg/㎡				
1段階減量	37.5 mg/㎡				
2段階減量	25 mg/㎡				
3段階減量					