

治療計画書

療法名 WeeklyTC(weeklyパクリタキセル+カルボプラチニ)

療法

1サイクル 3 週

疾患名 卵巣がん初回寛解導入(6サイクル)

注射	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
内服	Rp																																		
放射線	照射部位	照射量																																	
注射	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分																															
	デキサート	9.9 mg			●																														
	ファモチジン	20 mg																																	
注射	デキサート	9.9 mg	点滴	15分								●																							
	ファモチジン	20 mg										●																							
	生理食塩液	50 ml																																	
注射	生理食塩液	100 ml	点滴	30分					●																										
									●																										
注射	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴	1時間																															
	生理食塩液	250 ml			●																														
注射	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																															
					●																														
注射	カルボプラチニ	※AUC6	点滴	1時間以上																															
	生理食塩液	250 ml			●																														
		※最大800mg																																	
注射	生理食塩液	50 ml	点滴	10分					●																										
					●																														
注射																																			
注射																																			
注射																																			
注射																																			
注射																																			
内服	1 レスタミン	50 mg	パクリタキセルの30分前まで	●																															
	2 イメント	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前	●																															
	3 イメント	80 mg	1日1回朝食後	●●																															
内服	4 デカドロン	4 mg	1日1回朝食後	(●)(●)(●)																															
	5																																		
	6																																		
内服	7																																		
	8																																		
	9																																		
内服	10																																		
放射線		Gy																																	

特記事項

減量規定	
薬品名	カルボプラチニ
標準投与量	AUC6
1段階減量	AUC5
2段階減量	AUC4
3段階減量	中止
パクリタキセル	80 mg/m ²
	70 mg/m ²
	60 mg/m ²
	中止

制吐剤は適宜変更。