(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　TC(パクリタキセル+カルボプラチン)　療法　1サイクル 3～4 週

疾患名　卵巣がん(3～5サイクル)

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																											
		デキサート	19.8 mg																														
		ファモチジン	20 mg																														
注射	2	生理食塩液	100 ml	点滴	30分	●																											
注射	3	パクリタキセル	180 mg/㎡	点滴	3時間	●																											
		生理食塩液	500 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	5	カルボプラチン	※AUC5(3-6)	点滴	1時間以上	●																											
		生理食塩液	250 ml																														
			※最大800mg																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																											
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	レスタミン	50 mg	パクリタキセルの30分前まで		●																											
内服	2	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																											
内服	3	イメンド	80 mg	1日1回朝食後			●	●																									
内服	4	デカドロン	4 mg	1日1回朝食後			(●)	(●)	(●)																								
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名	カルボプラチン				
標準投与量	AUC5				
1段階減量	AUC4				
2段階減量	AUC3				
3段階減量					