(ID　0　) ☆7

治療計画書

Nogitecan+Bv(ノギテカン＋アバスチン)　療法　1サイクル 3 週

疾患名　プラチナ製剤抵抗性の再発卵巣癌

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	30分	●	●	●	●	●																	●	●	●	●	●		
		生理食塩液	100 ml																														
注射	2	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●	●	●	●	●																	●	●	●	●	●		
注射	3	ハイカムチン	1.25 mg/㎡	点滴	30分	●	●	●	●	●																	●	●	●	●	●		
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●	●	●	●	●																	●	●	●	●	●		
注射	5	アバスチン	15 mg/kg	点滴	※初回90分	●																					●						
		生理食塩液	100 ml		2回目60分可																												
					3回目以降																												
					30分可																												
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	10分	●																					●						
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
放射線			Gy																														

特記事項

・大きな手術を行った場合、少なくとも28日間経過していることを確認した上でアバスチン投与する。
・治療前に3レジメン以上の治療を受けていないこと。　・放射線治療歴がないこと。
・腎障害（Ccr:20～39 mL/分）のある患者では減量を考慮すること。（添付文書参照）

薬品名	ノギテカン	アバスチン			
標準投与量	1.25 mg/㎡	15 mg/kg			
1段階減量	1 mg/㎡				
2段階減量	0.75 mg/㎡				
3段階減量					