

# 治療計画書

療法名 EpiC(エピルビシン+カルボプラチン)

療法 1サイクル 3 週

疾患名 子宮体がん

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																																			
			用量(/日)	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
		照射部位	照射量																																					
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分																																			
		デキサート	4.95 mg			●																																		
注射	2	エピルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分																																			
		生理食塩液	100 ml			●																																		
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																																			
						●																																		
注射	4	カルボプラチン	※AUC4-5	点滴	1時間以上																																			
		生理食塩液	250 ml			●																																		
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																																			
						●																																		
注射	6																																							
注射	7																																							
注射	8																																							
注射	9																																							
注射	10																																							
内服	1	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前		●																																		
内服	2	イメンド	80 mg	1日1回朝食後		●	●																																	
内服	3	デカドロン	4 mg	1日1回朝食後		●	●	●																																
内服	4																																							
内服	5																																							
内服	6																																							
内服	7																																							
内服	8																																							
内服	9																																							
内服	10																																							
放射線			Gy																																					

### 特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。制吐剤は適宜変更。

### 減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量