(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　GemEpi(ゲムシタビン+エピルビシン)　療法　1サイクル 4 週

疾患名　子宮体がん(肉腫)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1						2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																												
注射	1	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分	●																									
		デキサート	9.9 mg																												
注射	2	デキサート	6.6 mg	点滴	15分																										
		生理食塩液	50 ml										●							●											
注射	3	ゲムシタビン	1000 mg/㎡	点滴	30分																										
		生理食塩液	100 ml			●							●							●											
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																										
						●							●							●											
注射	5	エピルビシン	40 mg/㎡	点滴	30分																										
		生理食塩液	100 ml			●																									
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																										
						●																									
注射	7																														
注射	8																														
注射	9																														
注射	10																														
内服	1	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後			●	●	(●)																						
内服	2																														
内服	3																														
内服	4																														
内服	5																														
内服	6																														
内服	7																														
内服	8																														
内服	9																														
内服	10																														
放射線			Gy																												

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					