

治療計画書

療法名

EpiP(エピルビシン+シスプラチン)

療法

1サイクル

3 週

疾患名 子宮体がん

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回) 用量(/日)	投与ルート 用法	投与時間																												
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																											
		照射部位	照射量																														
注射	1	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間																												
注射	2	ソリューゲンF	500 ml	点滴	2時間																												
注射	3	グラニセトロン	3 mg	点滴	30分																												
		デキサート	9.9 mg																														
注射	4	エピルビシン	40 mg/m ²	点滴	30分																												
		生理食塩液	100 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																												
注射	6	シスプラチン	70 mg/m ²	点滴	2時間以上																												
		生理食塩液	500 ml	全量500mlに調製																													
注射	7	ソリューゲンG	500 ml	点滴	2時間																												
		フロセミド	10 mg																														
注射	8	YDソリター-T3	500 ml	点滴	2時間																												
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	イメンド	125 mg	抗癌剤の1時間-1時間半前																													
内服	2	イメンド	80 mg	1日1回朝食後																													
内服	3	デカドロン	8 mg	1日1(-2)回朝(昼)食後																													
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量、ファモチジンの追加を行う。制吐剤は適宜変更。

減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量