(ID　0　) ☆7

# 治療計画書

療法名　TP(パクリタキセル＋シスプラチン)　療法　1サイクル 3 週

疾患名　進行又は再発の子宮頸がん

| 注射 / 内服 / 放射線 | Rp | 商品名 / 照射部位 | 用量(/回) / 用量(/日) / 照射量 | 投与ルート / 用法 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射 | 1 | ソリューゲンF | 500 ml | 点滴 | 2時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 2 | グラニセトロン | 3 mg | 点滴 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート | 9.9 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ファモチジン | 20 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 3 | 生理食塩液 | 100 ml | 点滴 | 30分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 4 | パクリタキセル | 135 mg/㎡ | 点滴 | 3時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 500 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 5 | 生理食塩液 | 50 ml | 点滴 | 10分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 6 | シスプラチン | 50 mg/㎡ | 点滴 | 2時間以上 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液 | 500 ml | 全量500mlに調製 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 7 | ソリューゲンG | 500 ml | 点滴 | 2時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フロセミド | 10 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 8 | YDソリターT3 | 500 ml | 点滴 | 2時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 1 | レスタミン | 50 mg | パクリタキセルの30分前まで | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 2 | イメンド | 125 mg | 抗癌剤の1時間-1時間半前 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 3 | イメンド | 80 mg | 1日1回朝食後 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 4 | デカドロン | 8 mg | 1日1(-2)回朝(昼)食後 | | | ● | ● | ● | (●) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線 | | | Gy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

特記事項

アレルギー予防のため適宜デキサートの増量を行う。制吐剤は適宜変更。

減量規定

| 薬品名 | パクリタキセル | シスプラチン | シスプラチン(腎機能低下時) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準投与量 | 135 mg/㎡ | 50 mg/㎡ | | 50 mg/㎡ | |
| 1段階減量 | 110 mg/㎡ | 37.5 mg/㎡ | 45＜CCr≦60 | 75 % | |
| 2段階減量 | 90 mg/㎡ | 25 mg/㎡ | 30＜CCr≦45 | 50 % | |
| 3段階減量 | 中止 | 中止 | CCr≦30 | 中止 | |