

治療計画書

療法名

MTX (メトトレキサート)

(ID 0) ☆7

療法 1サイクル 2 週

疾患名 侵入奇胎

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間																															
			用量(/日)	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		照射部位	照射量																																	
注射	1	メソトレキサート(50mg製剤)	20 mg	筋注																																
		注射用水	50mg/2mlで溶解			●	●	●	●																											
注射	2																																			
注射	3																																			
注射	4																																			
注射	5																																			
注射	6																																			
注射	7																																			
注射	8																																			
注射	9																																			
注射	10																																			
内服	1																																			
内服	2																																			
内服	3																																			
内服	4																																			
内服	5																																			
内服	6																																			
内服	7																																			
内服	8																																			
内服	9																																			
内服	10																																			
放射線			Gy																																	

特記事項

- ・1st line標準レジメン
- ・ロイコボリン投与で軽減されない口内炎、G3以上の肝機能障害、G4の骨髄抑制等が発現した場合はメソトレキサートを含まない他のレジメンを考慮。

減量規定

薬品名	メソトレキサート			
標準投与量	20 mg/body			
1段階減量	中止			
2段階減量				
3段階減量				