

治療計画書

療法名

VP-16 (エトポシド)

(ID 0) ☆7

療法 1サイクル 2 週

疾患名 侵入奇胎

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																											
						照射部位	照射量	用法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
注射	1	デキサート	6.6 mg	点滴	15分																												
		生理食塩液	50 ml			●	●	●	●	●																							
注射	2	ラステット	100 mg	点滴	2時間																												
		生理食塩液	500 ml			●	●	●	●	●																							
注射	3	生理食塩液	50 ml	点滴	10分																												
						●	●	●	●	●																							
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

- ・アレルギー予防のため適宜ファモチジン追加。
- ・メントレキセート抵抗性における2nd lineの標準レジメン。

減量規定

薬品名	標準投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量