(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　JALSG AML-201 強力寛解後 第3コース(Ara-C+ACR)　療法　1サイクル＿＿＿日

疾患名　急性骨髄性白血病

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●	●	●																							
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●	●	●																							
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	アクラシノン	20 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●	●	●	●	●																							
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	キロサイド	200 mg/㎡	点滴(側管)	24時間	●	●	●	●	●																							
		生理食塩液	500 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ						●																						
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

前治療の影響がなくなり、十分に骨髄機能が回復した後に施行

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					