(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名 JALSG AML-201(高齢者) 寛解後 第2コース(BHAC+VP+DM)　療法　1サイクル＿＿日

疾患名　急性骨髄性白血病

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	500 ml	点滴	キープ	●	●	●	●	●																							
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●	●	●																							
		デキサート	9.9 mg																														
注射	3	ダウノマイシン	30 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●	●	●																									
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	ラステット	100 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●	●	●																									
		生理食塩液	500 ml																														
注射	5	サンラビン	200 mg/㎡	点滴(側管)	3時間	●	●	●	●	●																							
		注射用水	10mg/mlで溶解																														
		生理食塩液	500 ml																														
注射	6	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●	●	●	●	●																							
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

・70歳以上ではダウノマイシンを25mg/㎡に、ラステットを75mg/㎡に減量する
・前治療の影響がなくなり、十分に骨髄機能が回復した後に施行
・ラステット希釈後の使用制限時間は3時間

減量規定

薬品名	ダウノマイシン	ラステット	サンラビン				
標準投与量	30 mg/㎡	100 mg/㎡	200 mg/㎡				
1段階減量	25 mg/㎡	75 mg/㎡	150 mg/㎡				
2段階減量	15 mg/㎡	50 mg/㎡	100 mg/㎡				
3段階減量							