(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名 アザシチジン静注+ベネクレクスタ(2サイクル目以降)　療法　1サイクル 4 週

疾患名　急性骨髄性白血病(AML)

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	100 ml	点滴	キープ	●	●	●	●	●	●	●																					
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●	●	●	●	●																					
		デキサート	6.6 mg																														
注射	3	ビダーザ	75 mg/㎡	点滴(側管)	10分	●	●	●	●	●	●	●																					
		注射用水	10mg/mlで溶解																														
		生理食塩液	50 ml																														
注射	4	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ	●	●	●	●	●	●	●																					
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	ベネクレクスタ	400 mg	1日1回食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

ベネクレクスタ:中程度以上のCYP3A阻害薬と併用する場合は減量を考慮。(詳細は添付文書参考)
適宜デカドロンの内服を追加する

減量規定

薬品名	ビダーザ				
標準投与量	75 mg/㎡				
1段階減量	37.5 mg/㎡				
2段階減量	25 mg/㎡				
3段階減量	中止				