(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名 シタラビン少量皮下注+ベネクレクスタ（1サイクル目）　療法　1サイクル 4 週

疾患名　急性骨髄性白血病（AML）

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	キロサイド	20 mg/㎡	皮下注	24時間毎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
注射	2																																
注射	3																																
注射	4																																
注射	5																																
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	ベネクレクスタ	100 mg	1日1回食後		●																											
内服	2	ベネクレクスタ	200 mg	1日1回食後			●																										
内服	3	ベネクレクスタ	400 mg	1日1回食後				●																									
内服	4	ベネクレクスタ	600 mg	1日1回食後					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

ベネクレクスタ：中程度以上のCYP3A阻害薬と併用する場合は減量を考慮。（詳細は添付文書参考）

減量規定

薬品名	ベネクレクスタ				
標準投与量	600 mg				
1段階減量	400 mg				
2段階減量					
3段階減量					