療法

1サイクル 4 週

## <sub>疾患名</sub> 急性骨髄性白血病(AML)

<sub>疾患名</sub> 急性骨髄性白血病(AML)																													
注射		<b>→</b> □ <i>a</i>	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1						2						3						4					7
内服			用量(/日)	用法		1	2	3	4 5	6			9 1	0 1	1 12	13			16 1	7 18	3 19	20	21 2	22 2	3 24	25	26	27 2	8
放射線		照射部位	照射量	-1	e.t. 00 <i>f</i>																								_
; <del>)</del>		キロサイド	20 mg/ <b>m</b> ²	皮下注	24時間毎	-																							
注射	1					•	•	•		•		•																	
711						1																							
																	1												1
注射	2																												
射	-					4																							
																	_											4	4
注						-																							
注射	3																												
-33																													
注射	4																												
射																													
							Н		+	-		-	H		-		$\dashv$		+	-		Н		+	-		$\dashv$	+	4
注						-																							
注射	5					1																							
																													Ī
注射	6					1																							
射						-																							
									+								-				H						-	+	4
注						-																							
注射	7																												
																													Ī
注射	8					_																							
射						-																							
							Н					+	+		+		+	-	+	+	+	Н			+		+	+	4
注						-																							
注射	9																												
																													Ī
注射	10																												
射						-																							
内服	1	ベネクレクスタ	600 mg	1日1回1	全後							•																•	7
内服			ooo mg	1 니 1 덴 1	x 1/2								_											_ •	_				Í
内服							Н						t				7					Н							†
内服	4																												
内服	_						Ц								L							Ц						4	⇃
内服							Ц								-		_					Н						4	4
内服							H		+						-		$\dashv$		+			Н			-		$\dashv$	+	$\frac{1}{2}$
内服	_						H		H	+			+		+		$\dashv$		+	+		H		+	+		$\dashv$	+	$\forall$
内服	_						H						t		H		$\dashv$		$\dagger$	$\dagger$	F	H			t		$\dashv$	$\dagger$	1
放射線			Gy				П										7					П					7		†
					特記事項					,																			]
ベネ	クl	レクスタ: 中程度以上のCYP3A阻割	<b>『薬と併用する</b> 』	場合は減量を考	「慮。(詳細	まま	添	付え	て書	参:	考)																		
	_				減量規定																								1
薬	П	名 ベネクレクスタ			-														_	$\top$	_								7

 薬品名
 ベネクレクスタ

 標準投与量
 600 mg

 1段階減量
 400 mg

 2段階減量
 3段階減量