(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　A-trippleV　療法　1サイクル＿＿週

疾患名　急性骨髄性白血病(難反応例)

注射	Rp	商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
内服			用量(/日)	用法																													
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	①200 ml	点滴	キープ	①	①	①	①	①	①	①			②		②																
			② 50 ml																														
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●	●	●	●	●																					
注射	3	ラステット	100 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●	●	●	●	●																							
		生理食塩液	500 ml																														
注射	4	キロサイド	100 mg/㎡	点滴(側管)	24時間	●	●	●	●	●	●	●																					
		生理食塩液	500 ml																														
注射	5	オンコビン	0.8 mg/㎡	点滴(側管)	30分										●																		
		生理食塩液	100 ml																														
注射	6	エクザール	6 mg/㎡	点滴(側管)	30分												●																
		生理食塩液	100 ml																														
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ								●		●		●																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1																																
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					