

治療計画書

療法名

JALSG APL-97 寛解導入(A群)

療法

1サイクル 週

疾患名 急性前骨髓球性白血病

・末梢白血球数、API 細胞数により併用薬の変更あり

・ベサノイドは最長60日まで経口投与

【A群】WBC3000/ μ l | 血漿かつAPL細胞(芽球+前骨髄球)1000/ μ l | 血漿のとき一ペサノイド単独

[B群]WBC3000/ μ l未満がAPL細胞(芽球+前骨髓球)1000/ μ l未満のとき→ベタイン+単独

[C群]WBC $10000/\mu\text{L}$ 以上のとき→ベサノイド+イダマイシン($12\text{mg}/\text{m}^2\text{日}$)+キロサイド($100\text{mg}/\text{m}^2$)

[D群] A、B、C群において、途中APL細胞(芽球+前骨髄球)が1000/ μ l以上のとき→イダマシイン(12mg/ m^2 日)+キロサイド(80mg/ m^3)を追加投与

減量規定

| 薬品名 | 減量規定 | | | | | |
|-------|------|--|--|--|--|--|
| 標準投与量 | | | | | | |
| 1段階減量 | | | | | | |
| 2段階減量 | | | | | | |
| 3段階減量 | | | | | | |