(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名　JALSG ALL-97 寛解導入　療法　1サイクル＿＿日

疾患名　急性リンパ性白血病(60歳未満)

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	①200 ml	点滴	キープ	①	②	②					②	②		②		②		②	②		②		②		②						
			②100 ml																														
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●																									
注射	3	ダウノマイシン	45 mg/㎡	点滴(側管)	30分	●	●	●																									
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	オンコビン	※1.3 mg/㎡	点滴(側管)	30分																												
		生理食塩液	100 ml			●							●							●							●						
			※最大2mg																														
注射	5	エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴(側管)	3時間																												
		生理食塩液	500 ml			●																											
注射	6	ロイナーゼ	3000 K.U./㎡	点滴(側管)	2時間																												
		注射用水	5000K.U./2mlで溶解											●		●		●			●		●		●								
		生理食塩液	500 ml																														
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ																												
							●	●					●	●		●		●		●	●		●		●		●						
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	プレドニゾロン	60 mg/㎡	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1週間で漸減中止														
内服	2																																
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

【ロイナーゼ皮内反応の実施方法】
各サイクル初回とロットが違う場合実施

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					