

治療計画書

療法名

JALSG ALL-97 寛解導入

療法

1サイクル ____ 日

疾患名 急性リンパ性白血病(60~64歳)

注射 内服 放射線	Rp	商品名	用量		投与ルート	投与時間	日																																		
			用量(/回)	用量(/日)																																					
		照射部位	照射量		用法																																				
注射	1	生理食塩液	①200 ml		点滴	キープ	①	②	②																																
			②100 ml																																						
注射	2	グラニセトロン	3 mg		点滴(側管)	30分																																			
注射	3	ダウノマイシン	30 mg/m ²		点滴(側管)	30分																																			
		生理食塩液	100 ml																																						
注射	4	オンコビン	※1.3 mg/m ²		点滴(側管)	30分																																			
		生理食塩液	100 ml																																						
			※最大2mg																																						
注射	5	エンドキサン	800 mg/m ²		点滴(側管)	3時間																																			
		生理食塩液	500 ml																																						
注射	6	ロイナーゼ	3000 K.U./m ²		点滴(側管)	2時間																																			
		注射用水	5000K.U./2mlで溶解																																						
		生理食塩液	500 ml																																						
注射	7	生理食塩液	50 ml		点滴(側管)	ルートフラッシュ																																			
注射	8																																								
注射	9																																								
注射	10																																								
内服	1	プレドニゾン	60 mg/m ²		1日1(-2)回朝(昼)食後																																				
内服	2																																								
内服	3																																								
内服	4																																								
内服	5																																								
内服	6																																								
内服	7																																								
内服	8																																								
内服	9																																								
内服	10																																								
放射線			Gy																																						

特記事項

【ロイナーゼ皮内反応の実施方法】
各サイクル初回とロットが違う場合実施

減量規定

薬品名				
標準投与量				
1段階減量				
2段階減量				
3段階減量				