(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名 JALSG ALL-97 地固め・強化（第4コース）　療法　1サイクル＿＿週

疾患名　急性リンパ性白血病

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2							3							4						
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																													
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●	●																							
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●	●																							
注射	3	ラステット	100 mg/㎡	点滴(側管)	2時間	●	●	●	●																							
		生理食塩液	500 ml																													
注射	4	キロサイド	200 mg/㎡	点滴(側管)	24時間	●	●	●	●																							
		生理食塩液	500 ml																													
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ					●																						
注射	6																															
注射	7																															
注射	8																															
注射	9																															
注射	10																															
内服	1	ロイケリン	60 mg/㎡	1日1回朝食後		●	●	●	●																							
内服	2	プレドニゾロン	60 mg/㎡	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●	●																							
内服	3																															
内服	4																															
内服	5																															
内服	6																															
内服	7																															
内服	8																															
内服	9																															
内服	10																															
放射線			Gy																													

特記事項

JALSG ALL-97 髄注（DEXA+MTX+Ara-C）療法併用

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					