(ID　0　) ☆7

治療計画書

療法名 JALSG ALL-97 地固め・強化（第6コース）　療法　1サイクル＿＿＿日

疾患名　急性リンパ性白血病

注射 / 内服 / 放射線	Rp	商品名 / 照射部位	用量(/回) / 用量(/日) / 照射量	投与ルート / 用法	投与時間	1						2							3							4						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ		●	●																								
				①																												
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分		●	●																								
				①	9:30(day2)																												
					10:00(day3)																												
注射	3	メソトレキセート	50 mg/㎡	点滴(側管)	30分																											
		5%糖液	50 ml	全量50mlに調製	10:00		●																									
				①																												
注射	4	メソトレキセート	450 mg/㎡	点滴(側管)	23時間30分																											
		5%糖液	500 ml	全量500mlに調製	10:30		●																									
				①																												
注射	5	オンコビン	※1.3 mg/㎡	点滴(側管)	30分																											
		生理食塩液	100 ml	①	10:30			●																								
			※最大2mg																													
注射	6	ドキソルビシン	45 mg/㎡	点滴(側管)	30分																											
		生理食塩液	100 ml	①	11:00			●																								
注射	7	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ			●																								
				①	11:30																												
注射	8	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●	●																						
		7%メイロン	20 ml	②	2:00																												
注射	9	ロイコボリン	15 mg	静注(側管)					●	●																						
				②	4:00																												
注射	10	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●	●																						
		7%メイロン	20 ml	②	6:00																												
注射	11	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●	●																						
		7%メイロン	20 ml	②	10:00																												
注射	12	ダイアモックス	250 mg	静注(側管)			●	●	●	●																						
		生理食塩液	20 ml	②	10:00																												
注射	13	ロイコボリン	15 mg	静注(側管)					●	●																						
				②	10:00																												
注射	14	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●	●																						
		7%メイロン	20 ml	②	14:00																												
注射	15	ロイコボリン	15 mg	静注(側管)					●	●																						
				②	16:00																												
注射	16	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間		●	●	●																							
		7%メイロン	20 ml	②	18:00																												
注射	17	YDソリターT3	500 ml	点滴	4時間	●	●	●	●																							
		7%メイロン	20 ml	②	22:00																												
注射	18	ダイアモックス	250 mg	静注(側管)		●	●	●	●																							
		生理食塩液	20 ml	②	22:00																												
注射	19	ロイコボリン	15 mg	静注(側管)				●	●																							
				②	22:00																												
内服	1	デカドロン	10 mg/㎡	1日1(-2)回朝(昼)食後				●	●	●																						

特記事項

・JALSG　ALL-97　髄注（DEXA+MTX）併用
・ロイコボリンはメソトレキセート投与開始36時間後より6時間毎に8回投与

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					