（ID　　0　　）☆7

治療計画書

療法名　JALSG ALL-97 地固め・強化（第8コース）　療法　　1サイクル ＿＿＿ 週

疾患名　急性リンパ性白血病

注射		商品名	用量(/回)	投与ルート	投与時間	1							2						3							4							
内服	Rp		用量(/日)	用法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
放射線		照射部位	照射量																														
注射	1	生理食塩液	200 ml	点滴	キープ	●	●	●	●																								
注射	2	グラニセトロン	3 mg	点滴(側管)	30分	●	●	●	●																								
注射	3	ノバントロン	8 mg/㎡	点滴(側管)	30分		●	●																									
		生理食塩液	100 ml																														
注射	4	キロサイド	200 mg/㎡	点滴(側管)	24時間	●	●	●	●																								
		生理食塩液	500 ml																														
注射	5	生理食塩液	50 ml	点滴(側管)	ルートフラッシュ					●																							
注射	6																																
注射	7																																
注射	8																																
注射	9																																
注射	10																																
内服	1	ロイケリン	60 mg/㎡	1日1回朝食後		●	●	●	●																								
内服	2	デカドロン	10 mg/㎡	1日1(-2)回朝(昼)食後		●	●	●	●																								
内服	3																																
内服	4																																
内服	5																																
内服	6																																
内服	7																																
内服	8																																
内服	9																																
内服	10																																
放射線			Gy																														

特記事項

JALSG ALL-97 髄注（DEXA+MTX+Ara-C）療法併用

減量規定

薬品名					
標準投与量					
1段階減量					
2段階減量					
3段階減量					